

INDICAÇÕES DE USO DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS

Concentrado de Hemácias Filtrado	IRC (preferencialmente bolsa com até 14 dias de coleta)	Concentrado de Hemácias Irrradiado	Exsangüineotransusão neonatal (RN até 28 dias) - irradiação de até 24h
	Hemoglobinopatias		Transfusão intrauterina (irradiação de até 24h)
	Politransfundidos / histórico de 2 reações febris não hemolíticas		RN prematuro (< 28 semanas) e/ou baixo peso (< 1200 g)
	Imunodeficiência congênita		Imunodeficiência congênita
	Candidatos a transplante		Pós transplantes de medula e órgãos sólidos
	Patologias onco-hematológicas (aplasia, linfomas, mieloma, leucemias)		Paciente em preparo para TMO
Crianças com até 04 meses de idade	Pacientes HIV positivo		
Prevenção de infecção por CMV e HTLV: paciente HIV positivo, transfusão intrauterina, gestantes	Patologias onco-hematológicas (aplasia, linfomas, mieloma, leucemias)		
Concentrado de Hemácias Lavado	Reações transfusionais alérgicas graves	Concentrado de Hemácias Recente	Transfusão maciça de RN (até 28 dias) e transfusão intrauterina - até 5 dias de coleta
	Pacientes com deficiência de IgA		Exsangüineotransusão de crianças até 4 meses - até 14 dias de coleta
			Pacientes com insuficiência renal - até 14 dias de coleta
		Pacientes cardiopatas - até 14 dias de coleta	